

# imodium compresse costo

[\[PDF\] teva viagra cost](#)

[\[PDF\] cost of quetiapine](#)

[\[PDF\] crestor price nz](#)

[\[PDF\] generic lexapro camber](#)

[\[PDF\] is diazepam generic for valium](#)

[\[PDF\] acyclovir philippine price](#)

[\[PDF\] tamoxifen pharmacogenetic testing](#)

La somministrazione concomitante di loperamide in singola dose di 16 mg e il ketoconazolo, un inibitore del CYP3A4, e la P-glicoproteina, ha mostrato un aumento dei livelli plasmatici della loperamide di 5 volte. Loperamide cloridrato 2 mg. Mal di testa cefalea, capogiri, sonnolenza. La loperamide inoltre, aumenta il tono dello sfintere anale, con conseguente riduzione dell'incontinenza e dello stimolo. In seguito 1 capsula o 1 compressa effervescente o 1 compressa orosolubile 2 mg o una capsula molle 2 mg dopo ciascuna evacuazione successiva di feci non formate molli. Dolore nella parte superiore dell'addome, Vomito. Diminuzione della diuresi ritenzione urinaria. Si sconsiglia l'uso concomitante di inibitori del citocromo CYP. Inizi il trattamento con 1 capsula 2mg; se necessario, prosegua con 1 capsula 2 mg dopo ogni evacuazione successiva di feci non formate. La loperamide si lega ai recettori oppioidi della parte intestinale, con conseguente inibizione del rilascio di acetilcolina e di prostaglandine. Eruzione bollosa a compreso sindrome di Stevens-Johnson, Necrolisi epidermica tossica ed Eritema multiforme, Angioedema a, Orticaria a, Prurito a. Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Faccia particolare attenzione prima di mettersi alla guida di veicoli o di utilizzare macchinari. Nonostante non siano disponibili dati in pazienti con disfunzione epatica, la loperamide HCl deve essere usata con cautela in questi pazienti a causa di un ridotto metabolismo di primo passaggio vedere sezione 4. Disclaimer e informazioni utili. Imodium 2 mg compresse orosolubili non richiede l'uso di acqua. In questi pazienti con colite infettiva di origine batterica o virale, trattati con loperamide cloridrato, si sono riscontrati isolati casi di costipazione con un aumentato rischio di megacolon tossico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. JOHNSON & JOHNSON SPA IMODIUM 8 CAPSULE 2MG. Principi attivi Una capsula rigida contiene: Principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg. Una compressa effervescente contiene: Principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg. Una compressa orosolubile contiene: Principio attivo: Loperamide cloridrato 2mg. Perché pagare di più? Trova Prezzi e il motore di ricerca che ti fa risparmiare sui tuoi acquisti. I prezzi più bassi per imodium 2 mg 8 capsule. Imodium 2 mg è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute. Imodium Compresse Orosolubili si usa nel trattamento sintomatico delle diarree acute. IMODIUM OROSOLUBILE si usa per il trattamento della diarrea in fase acuta. Composizione Principio attivo: Loperamide cloridrato 2mg Eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta, sodio bicarbonato. IMODIUM 2 mg capsule molli. I foglietti illustrativi di Imodium sono disponibili per le confezioni: IMODIUM 2 mg capsule molli IMODIUM 2 mg compresse orosolubili IMODIUM 2 mg capsule rigide. Indicazioni Perché si usa Imodium? A cosa serve? Questo medicinale contiene loperamide cloridrato, un principio attivo che. Scheda Prodotto Indicazioni terapeutiche Imodium Compresse Orosolubili si usa nel trattamento sintomatico delle diarree rubeninorchids.com/gia e Modalità d'uso Imodium Compresse Orosolubili deve essere assunto secondo le seguenti dosi: Adulti e bamb. Imodium 12 Compresse Orosolubili 2mg. CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA: Antipropulsivi. PRINCIPI ATTIVI: Loperamide cloridrato ECCIPIENTI: Capsule rigide 2 mg: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato. Una capsula rigida verde-grigia è costituita da: eritrosina (E); indigotina (E); ossido di ferro. Una capsula rigida contiene: Principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg. Una compressa orosolubile contiene: Principio attivo: Loperamide cloridrato 2mg. Una capsula molle contiene: Principio attivo: Loperamide cloridrato 2mg. Eccipienti con effetti noti IMODIUM 2 mg capsule rigide: lattosio mg. Per l'elenco. Aug 23, - Imodium capsule rigide 2 mg è un medicinale da automedicazione contro la diarrea che contiene il principio attivo Loperamide cloridrato. Il farmaco è prodotto dalla casa farmaceutica JANSSEN CILAG S.p.A. e commercializzato dalla Johnson & Johnson S.p.A. Il medicinale rientra negli antidiarroici.